

Hanneton

Contexte

- Les hannetons européens adultes sont des scarabées brun-rougeâtre de taille moyenne (environ 13-15mm de long).
- A l'état larvaire, on les trouve dans le gazon.
- Les hannetons européens adultes pondent vers juin-juillet. Les larves se nourrissent des racines du gazon, de juillet à fin septembre.
- A partir de novembre, ils s'enfouissent profondément dans le sol, où ils hibernent. Ils remontent à la surface au printemps, sous forme de scarabées.
- C'est en août et septembre, à l'état larvaire, que les dommages se voient le plus.
- Les premiers symptômes sont : un gazon qui jaunit et s'affaiblit, avec apparition de plaques irrégulières, absence de système racinaire.

Comment procéder ?

1. Vérifier qu'il n'y a pas de larves en août/septembre.
2. S'assurer, à l'automne, qu'il n'y a pas de dommages secondaires, ni d'activité inhabituelle des oiseaux.

Solutions i-Turf

Produit	Son action	Solution ICL
Lutte biologique à base de nématodes	S'attaque aux larves, quand elles sont jeunes et proches de la surface.	Se référer au guide phytosanitaire EV, à la rubrique insecticides homologués gazons



Solution ICL contre les hannetons

Lutte biologique à base de nématodes : se référer au guide phytosanitaire EV, à la rubrique insecticides homologués gazons.

ICL France - BU Specialty Fertilizers

Le Parc Millésime, Bât.2

119 rue Michel Aulas

69400 Limas

Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70 – Fax : +33 (0)4 74 69 70 08

E-mail : info.france@icl-group.com – Internet : www.icl-sf.fr

